

OENO:	31604
Protokoll (OENO megnevezés):	Váll, AP felvétel
Indikáció:	Traumás elváltozások kimutatása, degeneratív elváltozások (arthrosis), gyulladások.
Blende határok:	A felső szél 2 h. ujjal ér a váll fölé, oldalsó széle 1 h. ujjal ér túl a bőrfelszínen.
Anatómiai képletek:	vállízület
Képméret:	18x24 cm
FFT:	100 cm
Centrális sugár:	merőleges a vállízületre
Beállítás (beteg elhelyezése):	A beteg állapotának megfelelően a felvételt készíthetjük, ülő, álló, ill. fekvő testhelyzetben. A beteg 10-15 fokkal a vizsgálandó oldalra fordul, a karja minimális abductióban, supinált (tenyér felfelé) helyzetben van. Így a tuberculum maius kivetül.
Felvételi követelmény:	Az expositio értéket úgy kell megválasztani, hogy csont és lágyrész is ábrázolódjon; - a caput humeri kissé rávetül a cavitas glenoidealisra, - tuberculum maius a caput humerire vetüljön.
Megjegyzés:	Bizonyos esetekben szükség lehet befelé rotált felvételre is (pl. a habitualis vállficamnál gyakran látható felkarfej „defectus” J. C. Adams ajánlatára a felkar befelé forgatásával ábrázoljuk). Traumatizált beteg esetén a humerus lehetséges törése, ill. luxatioja miatt az AP felvételt a kar elfordítása nélkül kell végezni. A törzset fordítsuk el, míg a vállízület szinte AP helyzetbe kerül. Az ép oldalt célszerű alápolcolva megemelni. A vállízületi rés jobban ábrázolódik, ha a csövet cranio-caudalisan 25 fokkal és medio-lateralisan 15 fokkal döntjük. Oldaljelzés, gonádvédelem.